

## Neue Blattwespen. (Hym.)

Beschrieben von Fr. W. Konow p., Teschendorf.

1. Gen. *Labidarge* Knw.

Von *L. poecila* Klg., von der bisher nur das ♂ bekannt war, besitzt das Naturhistorische Museum in Madrid das ♀. Dasselbe entspricht dem ♂ vollkommen. Palpen gelb. Scheitel um die Hälfte breiter als lang. Zwischenraum zwischen Discoidalnerv und Cubitus länger als Intercostalnerv; Arealnerv hinter der Mitte der Discoidalzelle; Cubitalzelle 3 kürzer als 2, zum Ende erweitert. — Länge 10 mm.

2. Gen. *Arge* Schrnk.

1. *A. fuliginata* n. sp. ♂♀ *Nigra*; abdomine — segmento primo et feminae vagina exceptis — rufo; pedum tibis tarsorumque basi flavis; tarsorum articulis 2 vel 3 apicalibus et tibiaram posticarum summo apice nigris; palpis e fusco lutescentibus; alis fuscis, subhyalinis; area intercostali flavido-hyalina; litura obscuriore sub stigmatate sito areae radialis basin et cubitalis partem tegente; venis et stigmatate fuscis; costa et subcostae latere exteriori flavis.

*Ovata, nitida*; capite et thorace passim aeneo-micantibus; facie et mesopleuris albedo-, sincipite et mesonoto fusco-pubescentibus; capite pone oculos maris non, feminae vix dilatato; antennis maris caput una cum thorace, feminae thoracem longitudine aequantibus; feminae articulo tertio antice bisulcato et acute carinato, apicem versus incrassato; sulco frontali inter ocellum inferiorem et antennis bis impresso; marginibus lateralibus acutis, infra antennis in angulum acutum conniventibus; vertice super ocellos non elato, longitudine sua duplo latiore; alarum superiorum intervallo inter nervum discoidalem et cubitum sito nervo intercostali brevior; nervo areali medium cellulae discoidalis attingente; cellula tertia cubitali secundam longitudine superante. — Long. 7—8 mm.

Patria: Bosnia (Uvas).

Die neue Art, die ich Herrn Dr. Hensch in Krapina verdanke, könnte für *fuscipennis* H. S. verkannt werden, ist aber kleiner und an der bleichen Costa leicht zu unterscheiden. Beim ♀ werden die Flügel manchmal bleicher, und solche Exemplare könnten mit *melanochroa* Gmel. verwechselt werden; doch kennzeichnet dann die Art der gröfsere Substigmatikalfleck und der andere Bau der Stirn; bei *melanochroa* fehlt die Grube unter dem unteren Nebenaugen, die Supraantennalgrube ist gröfser, und die seitlichen, ziemlich stumpfen Kiele laufen unten nicht zusammen.

2. *A. Rothschildi* n. sp. ♀ *Coeruleo-vel aeneo-nigra*; *palpis luteis*; *pronoto — medio excepto —, segmentorum abdominalium 1.—6. vel 7. lateribus latis, primi dorsalis medio, decimo toto, vagina, ventre, pedibus flavis*; *pedum anteriorum coxis trochanteribusque nigris*; *articulorum tarsalium apice nigricante*; *pedum posteriorum coxis — apice excepto —, trochantero primo, tibiaram et articulorum tarsalium 3 anteriorum apice, 2 ultimis totis nigris*; *alis fuscescenti-hyalinis, sub stigmate vix fusco-liturgatis*; *area intercostali fusca*; *venis et stigmate nigris*.

*Ovata, nitida, cano-pubescentis*; *capite pone oculos dilatato*; *clipeo medio apice emarginato*; *facie infraantennali cano-pilosula, medio vix elata et non carinata*; *antennis crassis, thoracem longitudine aequantibus*; *articulo tertio brevissime cano-pubescente, antice acute carinato, summa basi subcurvato, apicem versus incrassato et subcompresso*; *fronte intraantennali lata, fere plana, supraantennali sub ocello inferiore sulcatim impressa*; *facie superiore et sincipite non dense punctatis*; *vertice super ocellos altius elato, longitudine sua fere duplo latiore*; *alarum superiorum intervallo inter nervum discoidalem et cubitum sito nervo intercostali brevioris*; *nervo areali ante medium cellulae discoidalis sito*; *nervo 3. cubitali super medium fracto*; *cellula 3. cubitali secundam longitudine aequante, apicem versus dilatata*. — Long. 10 mm.

*Patria: Africa or. Brit. (Kisumu).*

### 3. Gen. *Kokujewia* Knw.

Das ♂ von *K. ectrapela* Knw. entspricht dem ♀ vollkommen; doch ist das Mesonotum blauschwarz, und am Thorax sind nur die breiten Pronotumlappen rot; am Hinterleibe aufer der Basis nur der äußerste Rand der unteren Afterklappe und die Genitalien schwarz. Kopf hinter den Augen erweitert; Fühler so lang wie der Hinterleib.

### 4. Gen. *Sjoestedtia* Knw.

1. *S. hilaris* n. sp. ♀ *Rufa*; *capite cum antennis, pectore medio, abdominis apice et dorso medio, pedibus nigris*; *coxis trochanteribusque posticis brunnescentibus, tibiis anterioribus magis minusve rufescentibus, tarsis anticis fuscis*; *abdominis segmentis 1.—7. dorsalibus postice rufo-marginatis et utrobique latius rufo-limbatis*; *alis obscure fuscis*; *venis et stigmate nigris*.

*Ovata, nitida*; *facie inferiore et antennarum articulis 2 basalibus rufo-, sincipite et ano nigro-, thorace luteo-pilosulis*; *capite parvo, pone oculos angustato*; *clipeo antice rotundato-truncato*; *antennis crassiusculis, caput una cum thorace longitudine aequantibus*; *articulo tertio breviter nigro-pilosulo, antice acute carinato, apicem versus incrassato*; *fronte intraantennali tuberculatim elata, supra celeriter declivi et sulcatim im-*

*pressa, sub oculo inferiore deplanata; ocellis prominentibus; alarum superiorum cellula cubitali 1<sup>a</sup> multo longiore, latitudinem suam apicalem longitudine aequante; secunda tertiam longitudine duplo superante; nervo areali medium cellulae discoidalis attingente; vagina crassa, conchiformi, nigro-pilosula. — Long. 11 mm.*

Patria: Africa or. (Abessinia?)

### 5. Gen. *Rhagonyx* Knw.

Klug hat 1834 in Jahrb. Ins. v. 1 p. 242 eine *Hylotoma biramosa* aus Mexiko beschrieben, und zwar nur im männlichen Geschlechte, die seither versuchsweise in verschiedene Gattungen gestellt wurde. Norton rechnete sie zu *Ptilia*, Kirby zweifelhaft zu *Ptenus*, Cameron zuerst zu *Dioloceros*, und da er das ♀ gefunden zu haben meinte, brachte er die Art wieder zurück zu *Didymia* Lep. = *Ptilia* Lep. Da dieselbe jedoch wegen des von Klug beschriebenen Flügelgeäders unmöglich eine *Ptilia* sein konnte, dies Geäder aber so ziemlich mit dem Geäder des *Dioloceros formosus* Klg. übereinstimmte, so stellte ich in Wytzman, Gen. Ins. die Art unbedenklich in die Gattung *Dioloceros*. In Wirklichkeit ist es ein *Rhagonyx*.

Aus dem Museum in Madrid liegt mir ein ♀ vor, das dem von Klug beschriebenen Männchen vollkommen entspricht. Dasselbe ist dick, eiförmig, glänzend. Kopf und Mesopleuren mit dichter grauer Pubescenz; Mesonotum spärlich mit kurzen grauen Härchen besetzt. Kopf schmäler als der Thorax, hinter den Augen ein wenig erweitert. Maxillarpalpen ziemlich lang, schwarz; das letzte Glied schmal, gleichdick, die beiden vorletzten, besonders das drittletzte, ziemlich stark gegen das Ende erweitert, lang dreieckig. Clipeus nicht geschieden, vorn dreieckig ausgeschnitten, die Seitenecken breit gerundet. Untergesicht in der Mitte breit gewölbt, die Wölbung oben in ein schmales, schwaches Interantennalhöckerchen auslaufend, über dem eine kleine Supraantennalgrube deutlich eingedrückt ist. Fühler so lang wie Kopf und Thorax zusammen; Glied 3 fast gleichdick, an Basis und Ende ein wenig verdünnt, sehr kurz aber dicht behaart. Scheitel gewölbt, hoch über die Ocellen erhaben, durch Mittelfurche geteilt, doppelt so breit als lang. Mesonotum hoch gewölbt mit tiefen Furchen. Flügel dunkelbraun, über der äußersten Basis gelichtet, bleich durchscheinend; Geäder und Stigma schwarz. Zwischenraum zwischen Discoidalnerv und Cubitus so lang wie der 1. Cubitalnerv; Arealnerv trifft die Mitte der Discoidalzelle; Cubitalnerv 3 über der Mitte schnell, fast eckig gekrümmt und stark nach unten und einwärts geschwungen. Hinterleibsrücken glatt; Haut-

spalt sehr groß, wie das 1. Segment und die Basis des Bauches weiß; die Rückensegmente 2 und 3 gegen die Seite stärker, gegen die Mitte schwächer geschwärzt. Sägescheide wie der größere Teil des Hinterleibes rotgelb, nicht hervorragend, gegen das Ende verbreitert, am Ende ausgerandet und wie der Unterrand bleich behaart. — Länge 10 mm.

## 6. Gen. *Schizoceros* Lep.

1. *S. Henschi* n. sp. ♂♀ *Niger et pallide rufus*; capite et maris thorace, segmento primo abdominali, pedum coxis trochanteribusque nigris; maris femoribus subtus nigratis; abdomine — maris segmento primo excepto — et feminae thorace pallide rufis; palpis feminae rufis, maris basi nigricantibus, apice pallidis; pedibus feminae totis, maris tibias tarsisque pallide rufis; maris femoribus anterioribus basin versus magis minusve nigris, apice rufis, posticis rufis, summa basi, interdum etiam subtus nigratis; feminae tarsis apicem versus fuscatis; alis fuscescenti-hyalinis, area intercostali non obscuriore, basi non obscurata; venis et stigmatibus fuscis, costa basin versus rufescente.

*Parva, nitida*; capite et thorace maris longius pilosulis, feminae brevissime et subtilissime cano-pubescentibus; capite pone oculos subangustato; antennis maris caput una cum thorace, feminae thoracem longitudine aequantibus; articulo tertio feminae angusto, lineali, basi compressiusculo; carina intraantennali obtusiuscula; fovea supraantennali deleta; vertice longitudine sua duplo latiore; alarum inferiorum feminae area humerali medii segmenti basale longitudine aequante, maris multo breviora. — Long. 5—6 mm.

*Patria*: Croatia (Krapina).

Diese von Dr. A. Hensch bei Krapina erbeutete und demselben zu Ehren benannte Art ist dem *S. furcatus* Vill. fast gleich gefärbt, fällt aber schon durch ihre Kleinheit auf; *furcatus* ist 6—7 mm lang. Außerdem ist sie durch die Form der Fühler, den Bau der Stirn, die Kürze des Humeralfeldes im Hinterflügel und durch die Behaarung auf Kopf und Thorax des Männchens ausgezeichnet. Bei *furcatus* sind die Fühler des ♂ länger als Kopf und Thorax zusammen, und das 3. Glied des ♀ ist dick, in der Mitte ziemlich stark verdickt; der Intraantennalkiel ist scharf; die Supraantennalgrube ist klein, aber deutlich und tief eingedrückt; das Humeralfeld des Hinterflügels ist kürzer als der Basalabschnitt des Medius, der freie Teil des Brachius ist kürzer als der Arealnerv; endlich hat das Männchen des *furcatus* auf Kopf und Thorax nur eine äußerst feine und kurze Pubescenz.

7. Gen. *Periclista* Knw.

1. *P. bumasta* n. sp. ♀ *Rufa*; capite, antennis, metathorace, abdominis segmento primo, pectoris 2 maculis linea rufa divisis, pedibus, vaginae apice nigris; alis fuscis, inferioribus dilutioribus; venis et stigmate nigris.

*Ovata, nitida; capite fusco-, ore et thorace cano-pubescentibus; capite pone oculos non angustato, thorace angustiore; clipeo late emarginato; antennis abdomen longitudine aequantibus, apice vix attenuatis; articulo tertio 4<sup>o</sup> haud sesqui longiore; vertice convexo, super ocellos elato, longitudine sua vix latiore; mesonoto altius elato, sulcis profundis; lobis lateralibus medio crasse subruguloso-punctatis; scutello non elato; alarum superiorum cellula tertia cubitali secundam longitudine aequante, apicem versus parum dilatata, apice truncata; nervo 2. mediali interstitiali vel fere cellulae 2. cubitali inserto; areali medium cellulae discoidalis attingente et pone medium areae humeralis sito; alarum inferiorum cellula media non occlusa. — Long. 9 mm.*

*Patria: Sikkim.*

Die Type befindet sich im Madrider Museum.

2. *P. Dusmeti* n. sp. ♂ ♀ *Nigra*; pronoti angulis posterioribus angustis et tegularum margine exteriori albis; segmentis ventralibus postice subtiliter albido-marginatis; abdominis dorso medio in segmentis 3.—5. maris castaneo-liturato, feminae vix brunnescente; pedibus usque ad genua nigris; genibus, tibis, tarsis albicantibus; alis subfuscescenti-hyalinis; costa pallida; costae apice et stigmate dilute fuscis; ceteris venis nigris.

*Ovata, nitida; capite et mesonoto fusco-, ore et mesopleuris cano-pubescentibus; capite pone oculos maris fortius, feminae minus angustato; palpis et labro magis minusve pallidis; maxillarum 3 articulis basalibus maris incrassatis; clipeo antice rotundato-truncato, interdum medio subemarginato; antennis maris fere filiformibus, abdomen longitudine aequantibus, feminae apice subattenuatis, caput una cum thorace longitudine aequantibus; articulo tertio 4<sup>o</sup> sesqui longiore, quarto quintum longitudine aequante; 3 ultimis inter se fere aequilongis; facie superiore subtiliter subruguloso-sculpturata; fovea supraantennali vage impressa; area frontali fere deleta, sub oculo inferiore subimpressa; vertice longitudine sua fere triplo latiore; alarum superiorum nervo 2<sup>o</sup> mediali interstitiali, vel subinterstitiali, inferiorum cellula media non occlusa. — Long. 5—6 mm.*

*Patria: Hispania.*

Herr José M<sup>a</sup> Dusmet y Alonso hat das Männchen dieser Art, die demselben zu Ehren ihren Namen trägt, in mehreren Exemplaren bei Pozuolo de C<sup>a</sup> la Fuente aufgefunden; das ♀ besitze ich von Barcelona. Ein diesem ♀ außerordentlich ähnliches Exemplar von Tanger befindet sich in meiner Sammlung; doch halte ich dasselbe für eine andere Art. Ebenso ein Weibchen

von Corfu, das aber eine geschlossene Mittelzelle im Hinterflügel hat. Ich sehe davon ab, diese Tierchen zu benennen, bis sich mehr Material findet.

### 8. Gen. *Fenusia* Leach.

1. *S. glaucopis* n. sp. ♀ *Nigra*; palpis, labro, mandibularum basi, clipei apice, pronoti angulis extremis posterioribus, tegulis, alarum nodulis albidis; antennis nigricantibus, subtus et apicem versus pallide testaceis, articuli basalis pedicello albo; pedibus testaceis, coxis et trochanteribus magis minusve fusco-lituratis; tibiis albicantibus; alis limpidis; costa et stigmatibus testaceis, hac basi albida; ceteris venis fuscis.

*Ovata, nitida; facie et thorace breviter cano-, sincipite fusco-pubescentibus, capite lato, thoracem latitudine aequante, pone oculos fortiter angustato; clipeo truncato; antennis thoracem longitudine aequantibus, filiformibus, pilosulis; articulo tertio 4<sup>o</sup> sesqui longiore; fronte supraantennali vix sulcatim impressa; vertice brevi, longitudine sua triplo latiore; alarum superiorum nervo primo cubitali obsoleto vel deficiente. — Long. 3—4 mm.*

*Patria: Germ., Gall. Croat.*

Der *F. hortulana* Klg. sehr nahestehend, doch durch breiteren Kopf, kürzeren Scheitel und viel dunklere Färbung verschieden. Bei *F. hortulana* Klg. ist der Kopf schmaler als der Thorax, der Scheitel nur doppelt so breit als lang, das Pronotum größtenteils und die Mesopleuren bleich, ebenso auf dem Mesonotum der Seitenrand des Mittellappens und der Hinterrand der Hinterleibssegmente.

2. *F. nigripes* n. sp. ♂ ♀ *Nigra*; mandibularum apice brunneo, pedum genibus et tiliarum anticarum latere antico fuscis; alis subfuscescenti-hyalinis; costa et stigmatibus fuscis; ceteris venis nigris.

*Ovata, nitida; capite nigro-, thorace griseo-pubescentibus; capite thorace angustiore, pone oculos fortiter angustato; clipeo truncato; antennis thoracem longitudine aequantibus, filiformibus, pilosulis; articulo tertio 4<sup>o</sup> sesqui longiore; fronte superiore super antennis et sub oculo inferiore foveatim impressa; fovea supraantennali magna; vertice longitudine sua duplo latiore; alarum superiorum nervo radiali interstitiali vel cellulae 4. cubitali inserto; nervo primo cubitali deleto. — Long. 3—4 mm.*

*Patria: Slavonia.*

Von Herrn Dr. Hensch erbeutet und mir freundlichst mitgeteilt.

### 9. Gen. *Selandria* Leach.

Von *S. catellata* Knw. habe ich aus der Sammlung des Herrn Prof. Dr. J. Sahlberg in Helsingfors ein am Jenissei bei Kan-

taika erbeutetes Männchen gesehen. Dasselbe entspricht dem in den Ent. Nachrichten v. 26 p. 121 (1900) beschriebenen ♀ vollkommen und bedarf keiner weiteren Beschreibung.

### 10. Gen. *Netroceros* Knw.

1. *N. bellicornis* n. sp. ♂ *Flavus*; mandibularum apice nigricante; antennarum articulis 1<sup>o</sup>, 4 ultimis, quinti dimidio apicali flavescenti-albidis, 3<sup>o</sup>, 4<sup>o</sup>, quinti dimidio basali nigris; macula ocellari et 2 mesonoti vittis in lobis lateralibus sitis nigris, interdum lobi medii vitta nigricante; alis flavo-hyalinis; costa et stigmatibus flavis, subcosta et medii dimidio basali nigris, ceteris venis fuscis.

Ovata, nitida; capite et thorace brevissime et sparsim luteo-, vertice et macula ocellari fusco-pilosulis; labro flavo-piloso; capite crasso, pone oculos non angustato; clipeo brevi, apice bis submarginato; antennis abdomen longitudine aequantibus; articulo secundo crassitudine sua longiore; articulis 3.—5. longitudine decrescentibus, 4 ultimis multo brevioribus, inter se fere aequilongis, ultimo angustiore; fovea supraantennali lata, non profunda; ocellis superioribus fere sub linea oculos tangente positis; vertice quadrato; sincipite et mesonoto sparsim punctulatis; alarum superiorum cellula cubitali 2 anteriores unitas longitudine fere aequante; nervo areali medium cellulae discoidalis attingente; alarum inferiorum cellula media non oclusa; nervo areali curvato et areae humeralis apici insito. — Long. 10 mm.

Patria: Africa occ. (Kamerun).

2. *N. athalioides* n. sp. ♂ *Bicolor*; capite et mesothorace nigris; pronoto, metathorace, abdomine, pedibus flavis; tibiis tarsorumque articulis apice nigris, tarsorum posteriorum 2 articulis ultimis totis nigris; labro luteo; palpis obscuris; antennis nigris, scutello flavo-lituro; alis flavescendo-hyalinis, apice dilute infuscatis, area intercostali fusca; venis flavis, costa, subcosta, nervi discoidalis maiore parte nigris, stigmatibus nigro-fusco.

Mediocris, minus nitidus; capite et mesopleuris cano-, mesonoto dense fusco-pilosulis, capitis pube depressa, thoracis erecta; capite pone oculos non angustato; clipeo truncato; antennis crassiusculis, brevissime cano-pilosulis, caput una cum thorace longitudine aequantibus, ante apicem incrassatis, articulis 5 ultimis fere clavam fusiformem simulantibus; articulo secundo latitudine sua apicali non longiore; tertio quartum longitudine plus quam sesqui superante; quarto et quinto inter se fere aequilongis; 6<sup>o</sup>, 7<sup>o</sup>, 8<sup>o</sup> transversis; fronte super antennis transverse impressa; ocellis superioribus in linea oculos tangente positis; vertice quadrato; sincipite et mesonoto densius punctulatis; alarum superiorum cellula cubitali 2 anteriores unitas longitudine aequante; nervo areali pone medium cellulae discoidalis sito; alarum inferiorum cellula media non oclusa; nervo areali longius pone aream humeralem sito. — Long. 8 mm.

Patria: Africa orient. germanica.

3. *N. ietunus* n. sp. ♂ *Flavus*; capite — ore excepto —, pronoto, mesonoto cum scutello, tegulis nigris; palpis et antennarum 2 articulis basalibus flavis, flagello nigro; pedibus flavis, unguiculis fuscis; alis fuscis, venis nigris, stigmatate fusco.

*Parvus, nitidus*; capite et mesonoto fusco-, ore et mesopleuris luteo-pilosulis; capite pone oculos fortiter angustato; clipeo truncato; oculis magnis os versus fortius convergentibus; antennis gracilibus, breviter cano-pilosulis, ante apicem parum incrassatis, abdomen longitudine fere aequantibus; articulo secundo latitudine sua apicali duplo longiore, paenultimo latitudine sua fere longiore; fronte sub ocellis canaliculata, super antennis late impressa; ocellis superioribus sub linea oculos tangente positis; vertice longitudine sua parum latiore; alarum superiorum cellula tertia cubitali 2 anteriores unitas longitudine superante; nervo areali medium cellulae discoidalis attingente; alis inferioribus cellula media occlusa carentibus. — Long. 6 mm.

Patria: Africa occident. (N. Kamerun, Joh. Albrechtshöhe).

4. *N. calo* n. sp. ♀ *Bicolor*; capite — ore et facie inferiore et antennarum articulis 2 basalibus exceptis —, pronoti angulis posterioribus et margine superiore, mesonoto, scutello, postscutello nigris; tegulis nigricantibus; cetero corpore et pedibus flavis; tarsis posticis fuscis; vaginae apice nigro; alis fuscis, subpelluculentibus; venis et stigmatate nigris.

*Elongato-ovatus*; sincipite nigro-, mesonoto longius fusco-, mesopleuris brevissime luteo-pubescentibus; ore albido-pilosulo; capite pone oculos angustato; clipeo apice truncato; antennis caput una cum thorace longitudine superantibus, abdomine brevioribus; flagello medio subincrassato, basi et apice attenuato, nigro-piloso; articulo secundo magis minusve nigricante, crassitudine sua apicali non longiore; articulis 3.—5. longitudine gradatim decrescentibus; 4 ultimis multo brevioribus, inter se fere aequilongis; fronte super antennis late impressa; ocellis superioribus fere sub linea oculos tangente positis; vertice longitudine sua fere sesqui latiore; mesonoto parum nitente, sulcis profundis; abdominis dorso vix sculpturato, nitidiore, apice flavo-pilosulo; alarum superiorum nervo areali paullo pone medium cellulae discoidalis sito; alarum inferiorum cellula media non occlusa; nervo areali pone aream humeralem sito. — Long. 10 mm.

Patria: Africa occ. (Kamerun).

#### Übersicht der bisher bekannten Arten.

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1. Flügel gelb . . . . .  | 2.                              |
| — Flügel heller oder dunkler gebräunt . . . . .   | 3.                              |
| 2. Costa gelb; Ocellenfleck und 2 Mesonotumstreifen schwarz;<br>Fühler am Ende bleich; 10 mm l. | 1. <i>N. bellicornis</i> Knw. ♂ |
| — Costa schwarz; ebenso Kopf und Mesothorax, sowie die<br>Fühler; 8 mm l.                       | 2. <i>N. athalioides</i> Knw. ♂ |



3. Zweites Fühlerglied länger als dick; Hintertarsen gelb;  
6 mm l. 3. *N. ietunus* Knw. ♂
- Zweites Fühlerglied nicht länger als dick . . . . . 4.
4. Mund, Mesopleuren und Brust gelb; nur die Hintertarsen  
braun; 10 mm l. 4. *N. calo* Knw. ♀
- Kopf und Thorax schwarz; alle Tarsen schwärzlich;  
8 mm l. 5. *N. rufiventris* Knw. ♀

### 11. Gen. *Stromboceros* Knw.

*S. graciosus* n. sp. ♀ *Niger*; *pronoti limbo superiore, tegulis, mesonoto, scutello cum appendice, postscutello, abdominis maiore parte rufis; abdominis lata vitta dorsali segmentorum marginibus rufis interrupta et vagina nigris; palpis et pedibus rufis; coxarum basi magis minusve nigrata; tibis anterioribus et tarsis anticis luteis, postice fusco-vittatis; genibus, tibis, tarsis posticis nigris; interdum femoribus posticis basin versus nigratis; alis fusciscenti-hyalinis; venis et stigmatibus nigris; costa basin versus rufescente.*

*Elongatus, nitidus; capite fusco-, mesonoto luteo-, mesopleuris cano-pubescentibus; ore albido-pilosulo; capite pone oculos angustato; clipeo late emarginato; antennis abdomen longitudine aequantibus, brevissime nigro-pilosulis, medio incrassatis; articulo tertio 4<sup>o</sup> fere sesqui longiore; fovea supraantennali lata et profunda; area frontali bene determinata, impressa, utrobique acute marginata; vertice longitudine sua parum latiore; alarum superiorum cubito super basin fere fracto; cellula tertia cubitali 2<sup>a</sup> brevior, apicem versus dilatata; nervo areali pone medium cellulae discoidalis sito; vagina non exserta. — Long. 8 8,5 mm.*

Patria: Mexico.

Die Type befindet sich im Naturhistorischen Nationalmuseum in Madrid.